

## **Лечебно-профилактические методики применения минеральной воды с повышенным содержанием серебра**

### **Болезни почек и мочевыделительной системы:**

При хронических пиелонефритах, гломерулонефритах, циститах, пить минеральную воду температурой 25 – 30<sup>0</sup>С, за 30 – 60 минут до еды по 200-250 мл., 5-6 раз в день (от 1,0 до 2,0 л.), в течение 2-3 недель.

При мочекаменной болезни - для улучшения клубочковой фильтрации и канальцевой секреции почек и для быстрого выведения фрагментов конкрементов после операции – литотрипсии (ДУВЛ) рекомендуется пить негазированную минеральную воду с повышенным содержанием серебра температурой от 25 до 30<sup>0</sup>С, по 200 – 300 мл. (17 мл. на кг. веса), 5-7 раз в день, не менее 10-15 дней, ежеквартально (4 раза в год). Для профилактики пиелонефрита, цистита мочекаменной болезни в фазе ремиссии рекомендуется прием серебросодержащей минеральной воды по 250 – 300 мл., 4-5 раз в день, за 30-60 мин. до еды, 2-3 недели, 2-3 раза в год.

### **Заболевания желудочно-кишечного тракта:**

При хронических гастритах с пониженной и сохранённой секреторной функцией. Рекомендуется прием минеральной воды с повышенным содержанием серебра по 150-250 мл. утром натощак, и до приема пищи за 30 мин., и перед сном (800-1500 мл. в день). Температура воды 25-30<sup>0</sup>С. Курс лечения 2-3 недели. Повторные курсы лечения через 1-2 месяца, 2-4 раза в год.

При хронических гастритах с повышенной секреторной функцией, язвенной болезни желудка – минеральную воду следует пить по 150-200 мл. через 1,5-2 часа после приема пищи, а также натощак и перед сном, до 1200 мл. в день, теплой (25-30<sup>0</sup>С); курс лечения 2-3 недели. С профилактической целью повторные курсы питьевого лечения проводятся 2-4 раза в год.

### **Детям при дисметаболических нефропатиях:**

Назначают прием негазированной минеральной воды из расчета 5 мл на 1 кг веса ребенка, за 30-40 мин до еды, 3-4 раза в день при комнатной температуре воды 2-3 недели.

Санаторий «Рассветы над Бией» проводит профильное восстановительное лечение и реабилитацию вышеперечисленных заболеваний.

Для самостоятельного приготовления минеральной воды с повышенным содержанием серебра рекомендуем приобрести в аптеке или магазине наиболее подходящую Вам по химическому составу слабоминерализованную негазированную столовую воду (с минерализацией не более 0,5 г/л) и добавьте 1,5 -2 мл БАД «Коллоидное серебро Аджента» в 1 - 1,5 литра купленной воды.

Серебросодержащую воду нужно готовить непосредственно перед употреблением, что бы каждый день у вас было 1 - 1,5 литра свежей серебросодержащей воды.

**«НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ  
СРЕДСТВОМ»**